



Informations sur les écuvillons
Les informations sur le fabricant de l'écuvillon, le numéro CE et le représentant européen sont indiqués sur l'emballage du kit de l'écuvillon et la boîte d'emballage extérieur.

Information du fabricant
UNITE DE SERVICE FABRICANT/PRES-VENTE
Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.
Address: No.369 Hengda Road, Hi-tech Industry Development Zone, Qingdao, Shandong 266112, China
Tél: +86-532-58710705
Fax: +86-532-58710706
E-mail: sales@hightopbio.com

Representant de l'Union européenne
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

IFU-SARS-CoV-2, A/4, 2021-11

Spanish

Prueba rápida de Antígeno SARS-CoV-2
Les a l'aguard de la lumina (4x) completament arribat per a realitzar la prova.
Para diagnóstico in vitro para autoanálisis.

Prueba Rápida de Antígeno SARS-CoV-2
Propósito
La prueba rápida de antígeno HIGHTOP para autoanálisis se utiliza para la detección de anticuerpos IgG y IgM contra el virus de la gripe A de la cavidad nasal anterior humana. Se utiliza para detectar antígenos nucleoproteicos de SARS-CoV-2 dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas sospechosos de infección por coronavirus. Los resultados positivos de las pruebas pueden utilizarse para confirmar el diagnóstico definitivo de infección por coronavirus.

Importante para la autocaptación:
Tenga en cuenta que incluso si el resultado es negativo, no se garantiza la exclusión de la infección, ya que una prueba negativa no garantiza la ausencia de la infección. El posible error de nuestro producto puede resultar en un resultado incorrecto.

Entraga
Casete de prueba & desecante
Tubo de extracción con tampón, tapa y tapa de goteo
Hisopo

Nota: El diagrama sirve solo para referencia. Vea el objeto real para más detalles. La apariencia del tubo de extracción y el color de su tapa pueden ser diferentes del producto real, lo que no tiene ningún efecto para el uso normal.

Seguridad
Un error de 0,3 cm en la longitud del cabezal del hisopo de muestra no afectará los resultados, se puede utilizar normalmente.

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
Relejo/Temporizador
Bolsa de basura

Seguridad
1. Los kits de prueba deben almacenarse a temperaturas de 4-30 °C y no deben exponerse a la luz solar directa ni a la humedad. Antes del uso, las pruebas almacenadas a baja temperatura deberán llevarse a temperatura ambiente.

Seguridad
2. Adecuado para personas mayores de 16 años. Mantenga los kits de prueba fuera del alcance de los niños para reducir el riesgo de beber accidentalmente el líquido tampón o tragar piezas pequeñas.

Seguridad
3. El cassette de prueba debe usarse lo antes posible después de sacarlo de la bolsa de aluminio para evitar una exposición prolongada a la humedad, ya que esto podría afectar el resultado de la prueba.

Seguridad
4. Si el contenido de antígeno del virus en la muestra está por debajo del límite de detección, el resultado de la prueba puede ser negativo.

Seguridad
5. A temperatura ambiente (15-30 °C) y humedad inferior al 60%, los kits de prueba deben usarse dentro de la media hora después de abrir el empaque. Si la humedad supera el 60%, utilice inmediatamente después de abrir el empaque.

Seguridad
6. No congele los kits de prueba.

Seguridad
7. El equipo de prueba debe desecharse después de usarlo en una bolsa de basura con cerradura en la basura doméstica.

Seguridad
8. La operación incorrecta puede afectar la precisión de los resultados, como por ejemplo, muy poco tiempo efectivo en la solución tampón, muy poco o demasiado tampón en la solución, adición de muestra insuficiente, un tiempo de detección innecesario.

Seguridad
9. Pueden producirse resultados falsos negativos cuando el hisopo se coloca en una bolsa entre el muestreo y la evaluación.

Seguridad
10. No sucione la muestra con la boca.

Seguridad
11. Durante la prueba, no fume, coma, beba alcohol, no se maquille, no se ponga lejos de contacto ni se los quite.

Seguridad
12. Desinfecte las muestras o los reactivos derramados con desinfectante.

Seguridad
13. Si el reactivo de extracción entra en contacto con la piel o los ojos, lave / enjuague el área afectada con abundante agua. Si encuentra irritación, comuníquese con su médico.

Procedimientos de prueba
Deje que todos los componentes del kit de prueba alcancen la temperatura ambiente (15-30 °C) 30 minutos antes del uso y lávese las manos.

1. Preparación:
• Tenga un reloj listo o utilice un temporizador.
• Abra el tubo de extracción con tampón desdoblándolo la punta. No derame el líquido. Abra solo la boca superior del ecuvillon y la parte superior de la boca de extracción y desdoble el desecante.

• Retire el cassette de prueba y colóquelo sobre una superficie plana y limpia.
• El cassette de prueba queda inutilizable media hora después de abrirlo. Por lo tanto, realice la prueba de inmediato.

• Desembale el hisopo en el vástago.
• Retire el hisopo de la parte anterior del cassette.
• Inserte el hisopo aproximadamente 2-2,5 cm de profundidad en la primera fosa nasal. La punta del hisopo debe estar completamente sumergida en la cavidad nasal. Si siente resistencia, no penetre más profundamente en la parte anterior de la nariz.

• Frota 5 veces con movimientos circulares en la pared nasal interna (aprox. 15 seg.).
• Luego inserte el mismo hisopo en la segunda fosa nasal y repita el mismo procedimiento.

3. Preparación de la muestra:
Después del muestreo, sumerja el hisopo en la solución tampón y realice un giro de 10 segundos. Déjalo reaccionar por 1 minuto.

• Coloque el hisopo usado en el tubo de extracción. Recoja el líquido en el tubo.
• Retire el hisopo y colóquelo en la bolsa de basura.

• Cierre el tubo de extracción con la tapa mediante la tapa. Desatascala la tapa de goteo en la parte superior. La muestra está lista para ser analizada.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mezclado del tubo de extracción al depósito(s) para la muestra a cada prueba de muestra.

4. Evaluación de la muestra
• Agregue 2-3 gotas de líquido mez